

患者ID: _____ プロトコール名: Elotuzumab+Lenalidomide+DEX 投与歴: 初回・継続

患者氏名: _____ 投与開始日: 年 月 日 前回投与日: 年 月 日

生年月日: _____

身長: _____ cm 体重: _____ kg

体表面積: _____ m²

確認印	プロトコール	書記	薬局	看護師	医師
			確認印	確認印	確認印

回数→Day	①	②	⑧	⑨	⑮	⑯	22	23
① ポート開通確認用 生理食塩液10mlシリンジ: 1本								
② 経口デキサメタゾン								
Elotuzumab投与日: 28mg								
Elotuzumabなし(3コース目以降Day8,22): 40mg								
③ 生食50ml								
デカドロン 8 mg								
8mgバイアル: 1v								
15分								
④ 生食50ml								
ガスター 20 mg								
20mgアンプル: 1A								
15分								
④' 経口前投薬(アセトアミノフェン: mg)								
③と同時に								
※インターバル30分 or 生食 ml点滴 30分								
⑤ 生食 ml								
エムプリシテ								
(10mg/kg) mg								
300mgバイアル: v								
400mgバイアル: v								
※調整用注射用水 20mlアンプル: 本								
※第1サイクル 初回 0-30分(30ml/hr)→30-60分(60ml/hr)→以後(120ml/hr)								
2回目 0-30分(180ml/hr)→以後(240ml/hr)								
3-4回目 300ml/hr								
※第2サイクル以降は300ml/hrで開始可能								
※専用ルート使用(フィルター径0.22μm以下)								
生食50ml								
生食50ml: 1瓶								
※投与終了後Lenalidomide経口投与								

Elotuzumab	IR	グレード4	滴下中止
		グレード3	滴下中止(再開は原則不可)
		グレード2	滴下中止(グレード1に回復した場合は滴下再開可能 速度0.5ml/分で再開、30分毎に0.5ml/分ずつUP可 ※IR発現時の速度は超えない
		グレード1	速度0.5ml/分へ変更、30分毎に0.5ml/分ずつUP可
Dexamethason	IR	IR グレード1	変更なし
		IR グレード2	静脈投与のDEX: 10mgへ
		IR グレード3	経口DEX: 12-24時間前に8mg、3時間前に8mg
		IR グレード2再発	静脈投与のDEX: 18mgへ
Lenalidomie	腎障害	CCr=30-60	10mg/日
		CCr=<30	15mg/2日毎
		CCr=<30(透析)	5mg/日(透析後)
	血液障害	血小板=<30000	血小板数≥30000に回復後、15mg/日で再開
		血小板=<30000(2回目以降)	血小板数≥30000に回復後、段階的減量して再開
		好中球数<1000	好中球数≥1000に回復後、25mg/日で再開
MM再発難治性	MM再発難治性	好中球数<1000(2回目以降)	好中球数≥1000に回復後、15mg/日で再開
		好中球数<1000(2回目以降)	好中球数≥1000に回復後、段階的減量して再開
※25mg→20mg→15mg→10mg→5mg→2.5mg			

※デキサメタゾン(レナデックス): 別紙参照: 40mg/日→20mg/日→12mg/日→中止

【処方(院内処置算定)】	下記該当欄にチェック							
・Lenalidomide								
・経口デキサメタゾン(Elotuzumab投与日: 28mg)								
・経口デキサメタゾン(Elotuzumabなし(3コース目以降Day8,22): 40mg)								
・経口前投薬(アセトアミノフェン)								
・								

【適応基準】
 1. Multiple Myeloma
 2. Tranceplant / non-Tranceplant
 3. Primary / maintenance / other

1サイクル= 週	予定回数=2	Day	1	8	15	22	28
エムプリシテ	10mg/kg	↑	↑	↑	↑		
レブラミト	25mg/日	Day1-21					
DEX(経口)5時間前	28mg	↑	↑	↑	↑		
DEX(静脈)1時間前	8mg	↑	↑	↑	↑		
プレメディ 30-90分前	IR対策	↑	↑	↑	↑		
1サイクル= 週	予定回数=3-	Day	1	8	15	22	28
エムプリシテ	10mg/kg	↑		↑			
レブラミト	25mg/日	Day1-21					
DEX(経口)	40mg		↑		↑		
DEX(経口)5時間前	28mg	↑		↑			
DEX(静脈)1時間前	8mg	↑		↑			
プレメディ 30-90分前	IR対策	↑		↑			

★投与基準不適合項目にチェック							
【投与基準】	日	日	日	日	日	日	日
白血球数:							
好中球数:							
血小板数:							
ヘモグロビン値:							
総ビリルビン:							
AST/ALT:							
Cr:							
CCr:							
LVEF:							
非血液毒性(食欲低下を除く)がGrade2以下							

- 【要観察項目】
- ・動静脈血栓(抗血小板薬、抗凝固薬)
 - ・感染症(抗菌薬、抗ヘルペスウイルス薬、抗真菌薬)
 - ・神経障害
 - ・TLS(UA合成阻害薬)
 - ・心機能
 - ・血圧

※Elotuzumab
 注射用水調整(300mgバイアルは13ml、400mgバイアルは17mlで溶解)、溶解後濃度25mg/ml
 体重<46kgでは希釈液量は最大5ml/kg

体重	希釈液量
50kg未満	150ml
50~90kg未満	250ml
90kg以上	350ml

※Dexamethazone
 Elotuzumab投与前のDEXを一括して投与可能(33mgをDrip、減量段階は33mg→16.5mg→6.6mg)

確認印	計数	計量	立会監査	計数	計量	立会監査	計数	計量	立会監査

確認印	計数	計量	立会監査	計数	計量	立会監査	計数	計量	立会監査