

患者ID: _____ プロトコール名: omalidomide+Bortezomib+DEX 投与歴: 初回・継続

患者氏名: _____ 投与開始日: _____年____月____日 前回投与日: _____年____月____日

生年月日: _____

身長: _____ cm 体重: _____ kg

体表面積: _____ m²

確認印	プロトコール	書記	薬局	看護師	医師
			確認印	確認印	確認印

回数→	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
メインボトル	薬剤名																				
① ポート開通確認用 生理食塩液10mlシリンジ: 1本	1回量																				
② 生食	規格・計量																				
	投与速度																				
※調整用生理食塩液(静脈内=3.0ml、皮下=1.2ml) 5mlバイアル: 1本																					
※調整から8時間以内で投与を終了																					

Pomalidomide	mg/日	Day1-14																			
Dexamethazone	mg/日	Day																			

Pomalidomide	血液障害	血小板=<25000 好中球数<500 or FN発症 ※4mg→3mg→2mg→1mg→中止 ※G-CSFの投与考慮	血小板数≥50000に回復後、段階的減量して再開 好中球数≥1000に回復後、段階的減量して再開
	非血液毒性	グレード3以上 (好中球減少、血小板減少を除く)	グレード2まで回復後、段階的減量して再開 ※4mg→3mg→2mg→1mg→中止
Bortezomib	末梢神経障害	グレード1(疼痛あり)	段階的減量
		グレード2(動作制限なし)	※1.3mg/m ² →1.0mg/m ² →0.7mg/m ²
		グレード2(疼痛あり)	回復後、0.7mg/m ² で再開
		グレード3(動作制限あり)	※週1回へ変更考慮
血液障害	発熱を伴う好中球減少グレード3	好中球数≥750、血小板数≥25000まで延期(最長2週間)	
	7日以上持続するグレード4	回復後、段階的減量して再開、回復しない場合は中止	
	クール内で好中球数<750 " 血小板数<25000	最長2日間の投与延期 回復しない場合は休業	
非血液毒性	グレード3以上(神経障害を除く)	グレード2まで回復後、段階的減量して再開 ※1.3mg/m ² →1.0mg/m ² →0.7mg/m ²	

Dexamethazone 別紙参照: 20mg/日→12mg/日→8mg/日→4mg/日→中止

【処方(院内処置算定)】	下記該当欄にチェック
【院外処方(化学療法のレジメンとして含む薬剤)】	下記該当欄にチェック
・予防投与	
【自宅での副作用対応】	下記該当欄にチェック
・(発熱時): LVFX 500mg/回、アセトアミノフェン 400mg/回 (解熱しなければ受診)	

- 【適応基準】
- Multiple Myeloma
 - Tranceplant / non-Tranceplant
 - Primary / maintenance / other

1サイクル= 週	予定回数=1-8	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
ポマリスト	4mg/日	Day1-14																						
ベルケイド	1.3mg/m ²		↑			↑				↑				↑										
DEX(経口)	20mg/日		↑	↑		↑	↑			↑	↑			↑	↑									
1サイクル= 週	予定回数=9-	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
ポマリスト	4mg/日	Day1-14																						
ベルケイド	1.3mg/m ²		↑								↑													
DEX(経口)	20mg/日		↑	(↑)							↑	(↑)										↑	(↑)	

★投与基準不適合項目にチェック

【投与基準】	日	日	日	日	日	日	日	日
白血球数:								
好中球数:								
血小板数:								
ヘモグロビン値:								
総ビリルビン:								
AST/ALT:								
Cr:								
CCr:								
LVEF:								
非血液毒性(食欲低下を除く)がGrade2以下								

- 【要観察項目】
- ・動静脈血栓(抗血小板薬、抗凝固薬)
 - ・感染症(抗菌薬、抗ヘルペスウイルス薬、抗真菌薬)
 - ・神経障害
 - ・TLS(UA合成阻害薬)
 - ・心機能(QT)
 - ・血圧

確認印	計数	計量	立会監査	計数	計量	立会監査	計数	計量	立会監査
-----	----	----	------	----	----	------	----	----	------

確認印	計数	計量	立会監査	計数	計量	立会監査	計数	計量	立会監査
-----	----	----	------	----	----	------	----	----	------