患者ID：　　プロトコール名：5FU/l-LV+BV　　投与歴：　初回　・　継続

患者氏名：　　投与開始日：平成　年　月　日　　前回投与日：平成　年　月　日

生年月日：

身長：　cm　　体重：　kg

体表面積：　㎡

確認印	プロトコール	書記	薬局 確認印	看護師 確認印	医師 確認印

メインボトル	薬剤名	1回量	規格・計量	回数→ 投与速度	日	日	日	日	日	日	日	日
① ポート開通確認用 生理食塩液10mlシリンジ：1本												
② 5%ブドウ糖100ml	ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝｼﾘﾝｼﾞ 3mg/3ml	3 mg	3mgｼﾘﾝｼﾞ：1本	15分								
	プリンペラン	10 mg	10mgｱﾝﾌﾟﾙ：1A									
③ 生食100ml	ｱﾊﾞｽﾁﾝ (5mg/kg)(10mg/kg)	mg	100mg/4ml：(　) 400mg/16ml：(　)	初回90分 以降60～30分								
※1stでのBV＝5mg/kg、2ndでのBV＝10mg/kg												
④ 生食20ml(アバスチンラインのフラッシュ												
⑤ 5%ブドウ糖100ml	ﾚﾎﾞﾎﾘﾅｰﾄ (250mg/㎡)	mg	25mgﾊﾞｲｱﾙ：(　) 50.mgﾊﾞｲｱﾙ：(　) 100mgﾊﾞｲｱﾙ：(　)	30分								
⑥ 5%ブドウ糖100ml	5FU (500mg/㎡)	mg	250mgｱﾝﾌﾟﾙ：(　)	30分								

【処方(院内処置算定)】	下記該当欄にチェック							
・自己抜針用生理食塩液10mlシリンジ：1本								
・ｲﾒﾝﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ125mg：1ｶﾌﾟｾﾙ(ポート開通確認と同時に服用)								
・								
・								

【院外処方(化学療法のﾚｼﾞﾒﾝとして含む薬剤)】	下記該当欄にチェック							
・ｲﾒﾝﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ80mg：1-0-0(Day②③朝食後)								
・ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ錠0.5mg：6-2-0(Day②③)(※ｲﾒﾝﾄﾞ服用時は1/2量で)								
・								
・								

【自宅での副作用対応】	下記該当欄にチェック							
・(下痢時)ﾛﾍﾟﾐﾝ1mgｶﾌﾟｾﾙ：1-0-1を服用								
・(発熱時)：								
・(発熱時)：								
・								
・								

【適応基準】
1. 切除不能・進行再発大腸がん
2. PS 0～2
3. 以下の骨髄・肝・腎機能を有する症例
   白血球数：4,000～12,000/㎜、ﾍﾓｸﾞﾛﾋﾞﾝ：9.0以上、血小板数：100,000/㎜ 以上、
   総ビリルビン：1.8mg/dL以下、AST/ALT：100U/L以下、
   クレアチニンクリアランス：60ml/min以上

【適応基準(高齢者の場合)】
1. 75歳以上は除外
2. 前治療の多い3rd lineは施行しない
3. 70～74歳：症例ごとに検討
4. 前治療での副作用が許容されている(参考にする)
5. PS 0
6. 前治療の減量、治療延期が許容内

【アバスチン適応基準】
※消化管穿孔、重度の出血、動脈血栓、
　高血圧性脳症/クリーゼ発症例には再投与不可

・高血圧：コントロール可能になるまで休薬
・尿蛋白：1+(0.15g～1.0g/24hr)に回復するまで休薬
　※ネフローゼは投与中止

標準スケジュール		Day 1	・	8	・	15	・	22	・	29	・	36	・	43	・	50	・	56		Day 1	・	・
アバスチン	(5mg-10mg/kg)	↑				↑				↑				↑						↑		
レボホリナート	250mg/㎡	↑		↑		↑		↑		↑		↑								↑		
5FU	500mg/㎡	↑		↑		↑		↑		↑		↑								↑		

★投与基準不適合項目にチェック

【投与基準】	日	日	日	日	日	日	日	日
※白血球数：クール開始前(3000/1500以上)								
同一クール内(2000/1000以上)								
血小板数：75,000/mm3以上								
総ビリルビン：5.0mg/dL未満(5FU)								
※AST/ALT：100U/L以下								
間質性肺炎または肺線維症を認めない								
多量の腹水、胸水を認めない								
感染を疑わせる38℃以上の発熱がない								
非血液毒性(食欲低下を除く)がGrade2以下								

<備考>

※上記基準すべてを満たすまで投与延期

【減量基準】

白血球減少 (好中球)	クール開始時	グレード2	3000～2000	回復するまで投与延期 ※グレード4：20%減量
			(1500～1000)	
	同一クール内	グレード3	1900～1000	
			(990～500)	
血小板		グレード3	50000未満	20%減量
その他の非血液学的項目		グレード3以上		20%減量

確認印	計数	計量	立会監査	計数	計量	立会監査	計数	計量	立会監査

確認印	計数	計量	立会監査	計数	計量	立会監査	計数	計量	立会監査