患者ID：　　プロトコール名：ABVD(d)　　投与歴：　初回　・　継続

患者氏名：　　投与開始日：　年　月　日　　前回投与日：　年　月　日

生年月日：

身長：　cm　　体重：　kg

体表面積：　㎡

確認印	プロトコール	書記	薬局 確認印	看護師 確認印	医師 確認印

メインボトル	薬剤名	1回量	規格・計量	回数→ 投与速度	日	日	日	日	日	日	日	日
① ポート開通確認用 生理食塩液10mlシリンジ：1本												
② 生食50ml	ｱﾛｷｼ静注 ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ	0.75 mg 12 mg	0.75mgﾊﾞｲｱﾙ：1v 8mgﾊﾞｲｱﾙ：1.5v	30分								
②' 生食20ml	ｿﾙ･ｺｰﾃﾌ	100 mg	100mgﾊﾞｲｱﾙ：1v	iv								
③ 生食50ml	ｴｸｻﾞｰﾙ (6mg/㎡)	mg	10mgﾊﾞｲｱﾙ：(　)瓶	5分								
※ｴｸｻﾞｰﾙは1回最大投与量＝10mg/body												
④ 生食50ml	ﾌﾞﾚｵﾏｲｼﾝ (9mg/㎡)	mg	5mgﾊﾞｲｱﾙ：(　)瓶 15mgﾊﾞｲｱﾙ：(　)瓶	5分								
※ﾌﾞﾚｵﾏｲｼﾝは1回最大投与量＝15mg/body												
⑤ 生食100ml	ｱﾄﾞﾘｱｼﾝ (25mg/㎡)	mg	10mgﾊﾞｲｱﾙ：(　)瓶	30分								
⑥ 生食500ml	ﾀﾞｶﾙﾊﾞｼﾞﾝ D:(375mg/㎡) d：(250mg/㎡)	mg	100mgﾊﾞｲｱﾙ：(　)瓶	120分								
※調整用注射用水（DTIC＝100mgあたり注射用水10mlで溶解 ※点滴ラインも遮光				20ml：　瓶								
⑦ 生食50ml			生食50ml：1瓶	フラッシュ								

【処方（院内処置算定）】　下記該当欄にチェック

・
・
・

【院外処方（化学療法のﾚｼﾞﾒﾝとして含む薬剤）】　下記該当欄にチェック

・ST合剤orｲｿﾆｱｼﾞﾄﾞ

【自宅での副作用対応】　下記該当欄にチェック

・（発熱時）：LVFX 500mg/回　、ｱｾﾄｱﾐﾉﾌｪﾝ 400mg/回　（解熱しなければ受診）
・（嘔気時）：
・
・
・
・

【適応基準】
1. **Hodgkin** /
2. B-cell /
3. Indolent / Aggressive /
4. FL / DLBCL / MCL / MALT /
5. Tranceplant / non-Tranceplant
6. Primary / maintenance /

※DTIC　(D)375mg/㎡　or　(d)250mg

1サイクル＝　週	予定回数＝	Day 1	15	28
アドリアシン（DXR）	25mg/㎡	↑	↑	
ブレオ（BLM）	9mg/㎡	↑	↑	
エクザール（VBL）	6mg/㎡	↑	↑	
ダカルバジン（DTIC）	D:375mg/㎡	↑	↑	
〃	d：(250mg/㎡)	(↑)	(↑)	

★投与基準不適合項目にチェック

【投与基準】	日	日	日	日	日	日	日	日
白血球数：								
好中球数：								
血小板数：								
ヘモグロビン値：								
総ビリルビン：								
AST/ALT：								
Cr：								
CCr：								
LVEF：50%								
非血液毒性（食欲低下を除く）がGrade2以下								

【要観察項目】
・心機能
・DXR累積投与量
・BLM累積投与量
・HFS
・神経障害（筋、知覚、自律）
・TLS
・SWS
・FN

DXR	血液障害	好中球数＝1200-1800	25%減量	肝機能障害	T-Bil=1.5～3.0	50%減量
		好中球数＝＜1200	延期		T-Bil=3.1～5.0	75%減量
		血小板数＝75000-100000	25%減量		T-Bil=5.1以上	中止
		血小板数＝＜75000	延期			
BLM	血液障害	好中球数＝＜1200	延期	腎機能障害	CCr＝30-60	50%減量
		血小板数＝＜75000	延期		CCr＝10-30	中止
	肝機能障害	T-Bil=1.5～3.0　or　AST＝60-180	50%減量		CCr＝＜10	中止
		T-Bil=＞3.0　or　AST＝＞180	75%減量（中止考			
VLB	血液障害	好中球数＝1200-1800	25%減量	肝機能障害	T-Bil=1.5～3.0	50%減量
		好中球数＝＜1200	延期		T-Bil=3.1～5.0	中止
		血小板数＝75000-100000	25%減量		T-Bil=5.1以上	中止
		血小板数＝＜75000	延期			
DTIC	血液障害	好中球数＝＜1200	延期	腎機能障害	CCr＝30-60	25%減量
		血小板数＝＜75000	延期		CCr＝10-30	50%減量
		グレード4	25%減量		CCr＝＜10	中止
	肝機能障害	T-Bil＝3.1-5.0　or　AST＝180以上	25%減量			
		T-Bil＝5.1以上	中止			

確認印	計数	計量	立会監査	計数	計量	立会監査	計数	計量	立会監査

確認印	計数	計量	立会監査	計数	計量	立会監査	計数	計量	立会監査