患者ID：

プロトコール名：Pom-D
Pomalidomide+DEX

投与歴： 初回 ・ 継続

患者氏名：

投与開始日： 年 月 日

前回投与日： 年 月 日

生年月日：

身長： cm 体重： kg

体表面積： ㎡

確認印	プロトコール	書記	薬局	看護師	医師
			確認印	確認印	確認印

メインボトル	薬剤名	1回量	規格・計量	回数→ 投与速度	日	日	日	日	日	日	日	日
① ポート開通確認用 生理食塩液10mlシリンジ：1本												

【処方（院内処置算定）】	下記該当欄にチェック
・	
・	
・	

【院外処方（化学療法のﾚｼﾞﾒﾝとして含む薬剤）】	下記該当欄にチェック
・予防投与	

【自宅での副作用対応】	下記該当欄にチェック
・（発熱時）：LVFX 500mg/回 、ｱｾﾄｱﾐﾉﾌｪﾝ 400mg/回 （解熱しなければ受診）	
・（嘔気時）：	
・	
・	
・	
・	

【適応基準】
1. Multiple Myeloma
2. Tranceplant / non-Tranceplant
3. Primary / maintenance / other

1サイクル＝ 週	予定回数＝	Day 1	8	15	21	22	28
ポマリスト	4mg/日	Day1-21					
DEX（ﾚﾅﾃﾞｯｸｽ）	40mg/日	↑	↑	↑		↑	

★投与基準不適合項目にチェック

【投与基準】	日	日	日	日	日	日	日	日
白血球数：								
好中球数：								
血小板数：								
ヘモグロビン値：								
総ビリルビン：								
AST/ALT：								
Cr：								
CCr：								
LVEF：								
非血液毒性（食欲低下を除く）がGrade2以下								

【要観察項目】
- ・動静脈血栓（抗血小板薬、抗凝固薬）
- ・感染症（抗菌薬、抗ヘルペスウイルス薬、抗真菌薬）
- ・神経障害
- ・TLS（UA合成阻害薬）
- ・心機能
- ・血圧

Pomalidomide	血液障害	血小板＝＜25000	血小板数≧50000に回復後、段階的減量して再開
		好中球数＜500 or FN発症	好中球数≧1000に回復後、段階的減量して再開
		※4mg→3mg→2mg→1mg→中止	
		※G-CSFの投与考慮	
		グレード3以上	グレード2まで回復後、段階的減量して再開
	非血液毒性	グレード3以上 （好中球減少、血小板減少を除く）	グレード2まで回復後、段階的減量して再開 ※4mg→3mg→2mg→1mg→中止

※デキサメタゾン（レナデックス）：別紙参照：40mg/日→20mg/日→12mg/日→中止

確認印	計数	計量	立会監査	計数	計量	立会監査	計数	計量	立会監査

確認印	計数	計量	立会監査	計数	計量	立会監査	計数	計量	立会監査