

# ★生後6ヶ月～11歳の方の

## コロナワクチンのお知らせ★

**R6.10/14（月）より予約開始。**

**R6.11月より接種開始です。**

**インターネットでのご予約のみ**になりますので、  
病院ホームページにアクセスしていただき手続きに沿って  
ご予約をお取り下さい。

**※電話及び直接窓口でのご予約は承れませんので、  
何卒ご了承いただきますようお願い申し上げます。**

### ～接種期間～

**R6.11月～R7.3月の毎月第1水曜日**

**※R7.1月は第1水曜日がお休みの為、第2水曜日  
となります。**

・ **金額→1回につき 15,000円**

### ・ 注意点

**生後6ヶ月～4歳の方と5歳以上の方で接種のスケジュールが  
異なります。各スケジュール・詳細に関しては次ページ以降の  
説明を必ずお読みの上ご予約して下さい。**

**また、感染対策の為コロナワクチン単独のみで接種となります。**

・ **接種場所** 小児科外来

・ **持ち物**

診察券、母子手帳

問診票（インターネットから印刷）必ずご記入の上お持ち  
頂くようお願い致します。

※小児科に配布用紙もございます。

\* 母子手帳をお持ちでない場合、接種をお受けできません  
のでご注意ください。

\* 体温はご自宅を出る直前に測ってきてください。

37.5℃以上ある場合は接種できません。




## 本ワクチンの接種に際して

生後6ヵ月～11歳のお子さまへの接種は任意接種となります。

### 本ワクチン接種のスケジュール


#### <5歳以上のお子さま>

- ・ 前回の接種から少なくとも3ヵ月経過した後に接種を受けることができます。
- ・ はじめて新型コロナワクチンを接種するお子さまは、1回目の接種後、およそ4週間の間隔で2回目を接種できます。



#### <生後6ヵ月～4歳のお子さま>

- ・ 初回免疫（1・2回目接種）：1回目の接種後、4週間の間隔で2回目の接種を受けてください。
- ・ 本ワクチンは3回目以降の接種はできません。
- ・ 1回目に本ワクチンを接種した場合は、原則として2回目も本ワクチンの接種を受けてください。
- ・ 1回目と2回目を同時に予約する、カレンダーで接種スケジュールを管理するなどをおすすめします。
- ・ 1回目の接種から4週間を超えた場合には、できる限り速やかに2回目の接種を受けてください。
- ・ 本ワクチンを接種する部位は、年齢や筋肉量などによって異なります※。



※ 1歳未満のお子さまは、太もも外側に接種します。1～2歳のお子さまは、太もも外側もしくは肩（三角筋）に接種します。3歳以上のお子さまは、肩（三角筋）に接種します。ただし、明らかに筋肉量が少ない場合などは、年齢に関係なく太もも外側に接種することもあります。

## 本ワクチンの接種が受けられないお子さま、 接種にあたって注意が必要となるお子さまについて

本ワクチンの接種が受けられないお子さま、接種にあたって注意が必要となるお子さまについては、下記をご確認ください。該当する項目がある場合、あるいは該当する可能性があるが判断できない場合は、必ず接種前の診察時に担当医にお伝えください。

### ◎本ワクチンを接種できないお子さま

- 明らかに発熱（通常37.5℃以上）している方
- 重篤な急性疾患にかかっている方
- 過去にスパイクバックス筋注を接種した時にショック、アナフィラキシーがあらわれた方
- 過去にスパイクバックス筋注に含まれている成分で重い過敏症\*のあった方  
\*アナフィラキシー、全身のかゆみ、じんま疹、喉のかゆみ、ふらつき、動悸（どうき）、息苦しさ、血圧低下などのアナフィラキシーを疑わせる複数の症状
- 上記以外に医師が予防接種を行うことが不適切な状態にあると判断した方

### ◎本ワクチンの接種に注意が必要なお子さま

- 血小板減少症や凝固障害のある方、または抗凝固療法を受けている方
- 過去に免疫に異常があると診断されたことがある方や両親や兄弟に先天性免疫不全症の方がいる方
- 心臓や血管、腎臓、肝臓、血液の病気や発育の障害などの基礎疾患のある方
- 今までに、予防接種を受けて2日以内に発熱があった方や全身性の発疹などアレルギーが疑われる症状が出たことがある方
- 過去に痙攣（けいれん）を起こしたことがある方
- 本ワクチンの成分に対してアレルギーを起こすおそれがある方
- 腎機能障害のある方
- 肝機能障害のある方