

～今季はフルミストも実施します～ (経鼻弱毒性生インフルエンザ)

R6.10/14(月)より予約開始。

R6.10/30(水)より接種開始です。

インターネットでのご予約のみになりますので、病院ホームページにアクセスしていただき手続きに沿ってご予約をお取り下さい。

**※電話及び直接窓口でのご予約は承れませんので、
何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。**

～接種実施期間～

・ R6.10/30(水)～R6.11/30(土)

～接種対象者について～

・ 2歳から中学生まで

～接種回数について～

・ 1回

・ 金額→ 8000円

～接種の出来る曜日～ (完全予約制)

・ 月・水・土曜日 (風間Dr) PM14:30～16:30

※フルミスト注意事項※

- ・ 生ワクチンを接種された方は必ず4週間以上間隔を空けて下さい。

※以下の方はフルミストの接種ができませんのでご注意ください。

- ・ 発熱のある方 ・ 重篤な急性疾患にかかっている方
 - ・ 慢性疾患のある方 ・ 妊娠している方、その可能性が高い方
 - ・ 喘息をお持ちの方、または1年以内に喘息の発作があった方
 - ・ インフルエンザの成分（鶏卵、ゲンタマイシン、セラチン、アルギニン）に対して重度のアレルギーがある方
 - ・ アスピリンを服用している方 ・ 鼻汁、鼻閉がひどい方
 - ・ その他、医師が接種不相当と判断した方
- ・ 不活化ワクチンとフルミストを混合で接種することはできません。
 - ・ 在庫に限りがありますのでご了承下さい。
 - ・ その他の詳細は小児科に別紙をご用意していますのでフルミストでの接種をご希望の方はそちらをご確認ください。

注意点 ・ **接種場所** ・ **持ち物** については

★小児科インフルエンザ予防接種のお知らせ★に載せていますので、そちらをご確認ください。

経鼻弱毒生インフルエンザワクチン(フルミスト点鼻液)の接種をご希望の方へ

経鼻弱毒生インフルエンザワクチン(フルミスト点鼻液)の接種を実施するにあたり、接種を受けられる方の健康状態を把握する必要があります。そのため、裏面の予診票にできるだけ詳しくご記入の上、医師の診察をお受けください。

なお、お子さまの場合、健康状態をよく把握している保護者の方がご記入ください。

ワクチンの効果と副反応

本ワクチンはインフルエンザウイルスを弱毒化した生ワクチンです。接種後に体の中で増えたワクチンウイルスに対する免疫ができ、インフルエンザウイルスの感染を予防します。

一方、本ワクチンの接種に伴う副反応として、鼻閉・鼻漏、咳嗽、口腔咽頭痛、頭痛などがみられることがあります。また重い副反応としてショック、アナフィラキシー(じんましん、呼吸困難、血管性浮腫など)や、海外ではベル麻痺を含む脳神経障害、脳炎、けいれん(熱性けいれんを含む)、ギラン・バレー症候群(手足に力がはいらぬ、しびれ、食べものが飲み込みにくい、呼吸が苦しいなど)、血管炎(発熱、頭痛、倦怠感、紫斑、紅斑など)などが報告されています。

なお、副反応による健康被害が生じた場合の救済については、健康被害を受けた方または家族が独立行政法人 医薬品医療機器総合機構法に基づいて手続きを行うことになります。

詳しくは独立行政法人 医薬品医療機器総合機構のホームページ(<https://www.pmda.go.jp/>)をご覧ください。

予防接種を受けることができない方

- 1) 明らかに発熱している方(通常は37.5℃を超える場合)
- 2) 重い急性疾患にかかっていることが明らかな方
- 3) 過去に本ワクチンに含まれている成分で、アナフィラキシー(通常接種後30分以内に出現する呼吸困難や全身性のひどいじんましんなどを伴う重いアレルギー反応のこと)を起こしたことがある方
- 4) 明らかに免疫機能に異常のある疾患をお持ちの方、免疫抑制をきたす治療を受けている方
- 5) 経口または注射の副腎皮質ホルモン剤を使用している方
- 6) 妊娠していることが明らかな方
- 7) その他、医師が予防接種を受けることが不適当と判断した方

予防接種を受ける際に医師と相談していただく方

- 1) ゼラチン含有製剤またはゼラチン含有の食品に対して、ショック、アナフィラキシー(じんましん、呼吸困難、血管性浮腫など)などの過敏症を起こしたことがある方
- 2) 心臓血管系疾患、腎臓疾患、肝臓疾患、血液疾患などの基礎疾患のある方
- 3) 過去に予防接種で接種後2日以内に発熱、全身性の発疹などのアレルギーを疑う症状がみられた方
- 4) 過去にけいれん(ひきつけ)を起こしたことがある方
- 5) 過去に免疫状態の異常を指摘されたことのある方、または近親者に先天性免疫不全症の方がいる方
- 6) 重い喘息のある方または喘鳴の症状のある方
- 7) 薬の服用または食事(鶏卵、鶏肉、その他鶏由来のもの)で発疹が出たり、体に異常をきたしたことがある方
- 8) 発育が遅く、医師、保健師の指導を受けている方
- 9) 妊娠中または妊娠の可能性のある方(接種前1か月間避妊していない方)、授乳中の方
- 10) サリチル酸系医薬品(アスピリンなど)、ジクロフェナクナトリウム、メフェナム酸を服用している方

予防接種を受けた後は以下の点に注意してください

- 1) 接種後は、ショック、アナフィラキシー(じんましん、呼吸困難、血管性浮腫など)が起こることがありますので、医師とすぐ連絡が取れるようにしておきましょう。
- 2) 接種当日は過激な運動は避けてください。また、健康状態に十分注意し、体調の変化、高熱などの異常な症状を呈した場合には、すぐに医師の診察を受けてください。なお、接種当日の入浴は差支えありません。
- 3) 妊娠が可能な方は、接種後2か月間は妊娠をしないように注意しましょう。
- 4) 接種後1～2週間は乳児や重度の免疫不全の方との接触を可能な限り控えましょう。

あなたの接種予定日	医療機関名
<p>月 日 () です。</p> <p>当日は受付に 時 分頃 おこしください。</p>	

～インターネットでのインフルエンザご予約時の注意点～

※以下の方はフルミストでの接種ができませんのでご注意ください。

- ・発熱のある方 ・重篤な急性疾患にかかっている方
 - ・慢性疾患のある方 ・妊娠している方、その可能性が高い方
 - ・喘息をお持ちの方、または1ヶ月以内に喘息発作があった方
 - ・インフルエンザの成分（鶏卵、ゲンタマイシン、ゼラチン、アルギニン）に対して重度のアレルギーがある方
 - ・アスピリンを服用している方 ・鼻汁、鼻閉がひどい方
 - ・その他、医師が接種不相当と判断した方
- 生ワクチンを接種された方は必ず4週間以上間隔を空けてご予約して下さい。
- フルミストは1回の接種となります。
- 最終予約、キャンセルともに接種日の2日前までとなります。
- 今季のフルミスト接種期間は R6.10/30(水)～R6.11/30(水)までとなります。
- ご予約枠を複数個所取られた場合、こちらでキャンセルさせていただきます。他の患者様のご案内ができなくなる為予めご了承下さい。